Lu 1°. Le 8. avril 1765

2°. Le 22

N°. ~~[illegible]~~ 114.

Observation sur une hernie avec gangrene

Vers Le mois D'aoust 1730 feu M. Lesne mon Cousin fut prié de se rendre, à une Lieue Et demie de Paris pour y Voir un jardinier attaqué d'une hernie inguinale; Cet homme Etoit fort Et Vigoureux Et agé d'Environ 40 à 42 ans: Depuis Cinq ou Six ans qu'il ~~Le malade~~ portoit Cette hernie, il ne Lui Etoit arrivé aucun accident, ayant toujours Eu L'attention de La maintenir par un Bandage; Toutes Les fois qu'elle Sortoit il La faisoit rentrer facilement; néanmoins La hernie ayant reparu un jour, il ne Lui fut pas possible de La réduire; Les tentatives que fit même Le Chirurgien du Lieu, qu'il avoit appellés, furent inutiles; Les Saignées, Et Les Cataplasmes qu'il appliqua Sur La tumeur n'Eurent pas plus de Succès, Et il y avoit déja trois jours que Le malade Etoit En Cet Etat Lorsque M. Lesne fut mandé: je L'y accompagnai Et nous trouvâmes une tumeur dans L'aine gauche de La grosseur du poing;

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 15 d 111

Elle Etoit fort dure, Et La Couleur de La peau n'étoit point Changée: Le malade n'avoit rien rendu par Les Selles depuis son accident Et depuis deux jours il Vomissoit Les matieres stercorales: Dans cette position M. Lenu se détermina Sur Le Champ à Lui faire L'opération. Lorsque Les téguments Et Le sac furent ouverts, L'intestin ileon parut seul former La hernie; à Sa Couleur brune il étoit aisé de Voir qu'il avoit Souffert de L'inflam-mation, Et quoique dans cette disposition il y Eut Lieu de Craindre La gangrene, son intégrité Et La Vie dont il paroissoit jouir Encore faisoient Espérer qu'après Etre réduit dans Le Ventre, La Chaleur naturelle pourroit ranimer L'action affoiblie des Vaisseaux dans Cette partie de L'intestin; il y avoit Cependant peu à Compter Sur Cette ressource; néanmoins, après avoir Légerement débridé L'anneau avec Le bistouri Et fomenté L'intestin avec un peu de Vin tiède, il fut replacé dans Le Ventre avec toutes Les précautions qu'Exigeoient L'Etat des parties affectées: On ne vit à

L'Entrée de L'anneau qu'une petite bandelette
de Linge trempée dans Le jaune d'œuf, Le
reste de L'appareil fut placé à L'ordinaire.
Le malade ne fut pas Longtems sans ressentir
du Soulagement; Les Vomissemens Cesserent,
Et au moyen de quelques Lavemens Emolliens
Et des potions huilleuses, on obtint dans La
journée même Et dans La nuit Suivante
plusieurs Evacuations par Les selles, qui
annonçoient que La Liberté Etoit rétablie
dans toute L'Etendue du Canal intestinal.
Les Choses se soutinrent dans Le meilleur Etat
Et il y avoit tout à Espérer du succès, Lorsque
Le 3e jour, Etant allé pour Le panser, je
trouvai L'apparail inondé de matières stercorales
qui s'Etoient fait jour par une Crevasse faite
à L'intestin: Malgré cet accident Le malade
Etoit assés bien, Et je Conjecturai dès Lors que
L'adhérence formée à La Circonférence de
L'anneau s'opposoit à L'Epanchement des
matieres dans Le bas Ventre; je me Contentai
Seulement de mettre sur La playe un
plumaceau Couvert de digestif Et de penser

Le malade Légerement pour ~~facilites~~ ne pas gener L'issu des matieres au dehors: La quantité qui Couloient par La playe obligea de penser plusieurs fois dans La journée. Le huitieme jour à La Levée de L'appareil je trouvai à L'entrée de La playe une portion de L'intestin flétrie Et gangrenée; je La tirai avec mes pinces avec La meme facilité qu'un Bourdonnet qui y auroit Eté introduit; Elle Etoit fort Considérable Et telle que j'ai L'honneur de La présenter à L'académie. je L'Examinai Et je trouvai que toute La partie de L'intestin Sortie Et Etranglée Etoit attachée à une portion du mésentere comprise dans L'Etranglement Et que Le tout s'Etoit detaché Comme un Escarre se separe de La partie saine; Elle avoit Environ 13 à 14 pouces de Longueur. Malgré un retranchement si Considérable de L'intestin, il ne survint aucun accident au malade; Les matieres Continuerent de Couler par La playe Et il n'en passa plus par Le rectum; il parvint à se rétablir En Conservant néanmoins un anus artificiel;

il Survécut encore à Cette incommodité L'Espace d'un an au bout duquel il mourut d'une fluxion de poitrine dont il, fut attaqué alors.

Quoique Les Exemples de hernies avec gangrene Soient fort multipliés Et que L'academie renferme dans Ses recueils beaucoup d'observations Semblables dont Les Succès ont Eté Encore plus heureux que Celui que je viens de rapporter; Cependant il y En a peu qui presentent un fait où La perte de Substance Soit aussi Considérable que dans Le Cas dont il S'agit ici: Presque tous Les malades n'ont dû Leur guérison qu'aux Soins Seuls de La nature dont Les ressources ont Eté au delà de toute Espérance, puisqu'elle a Souvent plus accordé que L'art n'auroit pu obtenir. Dans toutes Les hernies avec gangrene Les matieres stercorales Se Sont fait jour au dehors En Crevant L'intestin, Et Si dans ce cas La pluspart Etoient réduits à garder un anus artificiel, il S'en est trouvé plusieurs à qui, par un bonheur inattendu, Cette incommodité n'est point resté, En obtenant une guérison parfaite par La Consolidation

de La playe et par Le rétablissement du Cours
des matieres stercorales par Les voyes ordinaires.
un Evénement aussi heureux sembloit devoir
arriver plustôt dans Les cas où L'intestin n'étoit
simplement qu'ouvert dans une partie de son
Diametre, ou n'avoit perdu que peu de sa substance;
Les Bords étant moins écartés L'un de L'autre,
ils avoient plus de facilité à se réunir, ce qui
Etoit favorisé par Les adhérences qui Les soutenoient.
Mais Cela paroit plus difficile dans Les
hernies où La portion d'intestin gangrené s'est
séparé dans une très grande Etendue, parceque
L'Eloignement des bords de L'intestin rompu
Empêche qu'ils ne puissent se réunir. Ce n'est
pas Cependant que La perte de substance de
La totalité du Cylindre de L'intestin soit toujours un obstacle à La Conso-
lidation de La playe, L'observation de Mr.
Pipelet* fournit un Exemple du Contraire; mais
il faut observer que, dans Le fait qu'il rapporte,
il ne se sépara que Cinq pouces d'intestin
gangrené, au lieu que dans Celui dont il est ici
question il s'en est séparé plus d'un pied:
On objectera peut être qu'il est absolument Egal

* Mem. de l'Acad. de Chir. T. 3

que L'anse d'intestin compris dans L'Etranglement
soit Considérable ou quil ne Le soit point, puisque
Les deux Extrémités de L'anse renfermés dans
L'anneau qui Les Comprime se touchent
immédiatement dans Cet Endroit, que Lors de
La séparation de La portion gangrené Les deux
ouvertures de L'intestin sont près Lun de lautre,
Et que, maintenues dans Cet Etat par Les adhérences,
il Leur est plus facile de se réunir par Leur
approximation réciproque: Cela peut arriver
En Effet si La pourriture s'est borné à
L'anneau seulement; mais Comme il est
possible aussi quelle se soit prolongé bien
audelà dans L'intérieur du Ventre, La séparation
s'en fera dans L'Endroit où Elle sera borné,
Les deux ouvertures seront plus Eloignées L'une
de L'autre, Elles ne pourront se réunir Et Les
matieres Continueront de Couler par L'ouverture
de La playe.

j'ai dit dans mon observation que L'intestin,
quoique malade, fut replacé dans Le Ventre
dans L'Espérance quil pourroit se ranimer,
Et que L'anneau fut debridé avec L'instrument

Et La malade fut parfaitement guérie dans L'Espace d'un mois.

On voit par cette observation que L'Etranglement de L'intestin peut subsister plusieurs jours sans être suivie de gangrene. Le grand age de La malade a beaucoup contribué sans doute à La sauver de ce facheux accident; Et personne n'ignore que dans La Vieillesse, Les inflammations causent moins de ravages que dans un age moins avancé.

Lesne